

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷五十九

明周王朱橚撰

舌門

總論

夫凡舌者心主小腸之候也重十兩長七寸廣二寸半  
善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脉凝  
而變色多食苦則舌皮稿而外毛焦枯多食辛則舌筋  
急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而唇揭多食甘則舌根

痛而外髮落且心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹  
此五味內合五臟之氣熱則生瘡引唇揭赤若腑寒則  
舌本縮口噤唇青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟  
腑調之舌縮口噤唇青升麻煎主之○舌者心之官主  
嘗五味以榮養於身資於脾以分布津液於五臟故心  
之別脉係於舌本肝脉絡于舌本脾脉連舌本散舌下  
凡此三經或為風寒濕所中使人舌縮卷而不能言或  
憂怒思恐所鬱則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡

肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪諸證雖異治之各有方○舌者脾脉之所通心氣之所生和則知味資於脾而榮於身者也二臟不和風寒中之則舌強而不能言壅熱攻之則舌腫不能言語更有重舌木舌舌胎出血等證皆由心脾虛風熱所乘而致且更有傷寒舌出過寸此虛毒熱攻心也但舌瘡一證不特因實熱所致亦有虛熱上攻而就者却不可倒用涼藥也貴乎鎮墜寧心而已局方所載黑錫養正二丹並以冷鹽水送下

用之多效

重舌論

大人小兒重舌候者心脾有熱故也心候於舌而主血脾之絡脉又出舌下心火脾土二臟子母也有熱則血氣俱盛其狀附舌下近舌根處遂令舌下血脉脹起如小舌狀故謂之重舌蓋心開竅於舌足太陰之脉屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下故也

方

紅雪煎

出聖濟  
總錄

治心脾有熱生重舌

羚羊角

升麻

吳藍

黃芩

去心

芍藥

人參

大青

淡竹葉

一切各  
一兩

檳榔

為末  
三兩

木香

為末  
三兩

木通

剉

山梔子

去皮

丹砂

研

蘇枋木

椎碎  
煎

葛根

各一兩  
椎碎

朴硝

剉

研一  
升

桑根白皮

一兩

枳殼

去瓤  
炒三分

麝香

碎半  
兩

甘草

炙  
二

兩

右除朴硝蘇枋木丹砂木香麝香檳榔外剉如麻豆

大以水二斗五升煎至九升濾去滓再煎沸下朴硝

不住手以柳篋攪候水脚欲盡下蘇枋木汁煎更三五沸於新砂盆中次下木香檳榔麝香丹砂等末攪令勻每服一錢綿裏燕津甚者蜜水調下一錢食後服之

石膏煎

出聖濟總錄

治心脾積熱生重舌及時行陰黃丹

石發動一切熱毒

石膏

凝水石

滑石

並碎各一斤

鬱金

研

犀角

各一兩

黃芩

去黑心五兩

升麻

三兩

山梔子

去皮二兩

黃連

去鬚三兩

苦硝

研一  
斤 馬牙硝 研半  
兩

先以石膏凝水石滑石等用水三斗入金十兩亦得  
煎至七升去滓再煎先下芒硝煎三兩沸次下馬牙  
硝攪令化不佳手攪良久用一新瓦盆傾出凝結每  
服一錢用蜜水調下大人小兒以意加減服

牛黃散 出聖濟  
總錄

治重舌

牛黃 研 人參 各半  
兩 白茯苓 去黑皮  
三分 大黃 剉炒  
半兩 當歸

切炒 甘草 各半  
兩 丹砂 研一  
分 麝香 研半  
兩



右為細散每服半錢溫水調下甚者加至一錢食後服

朴麝散

出聖濟總錄

治重舌及天行陰黃丹石發動一切

熱毒

朴硝

研五兩

麝香

研一分

黃芩

去黑心半兩

山梔子

去皮一兩

甘

草

炙一分

淡竹葉

握一兩

蘆根

剉一兩

右剉五味如麻豆大研者二味以新汲水三升將藥入鑪中煎約半升已來去滓澄清取甕瓶一箇傾藥

汁在內以物蓋定瓶口用鹽泥固濟慢火煨一周時  
去火令冷却將瓶安在水中無令水滿至瓶口浸經  
一宿至明日打破瓶子取藥如金色研為細散每服  
半錢冷水調服綿裹嚥津亦得

牛黃散

出聖惠方

治重舌口中涎出水漿不收

牛黃

龍腦

朱砂

各一分

太陰玄精石

二兩

右細研為散每度用藥一錢先於重舌上以鈹針鈹  
破出血用鹽湯漱口然後摻藥於舌上嚥津神效

芝隱方

出海上方

治重舌或不能言

乾薑 蒲黃

右等分為末乾搽即愈蓋二藥陰陽得中宋度宗春  
月欲賞花飲宴不意一夜重舌滿口不能飲食蔡御  
醫進此方立效因此入內

黃藥湯 治舌腫及重舌

黃藥 甘草

灸剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服

治重舌

皂角刺

燒灰為末

扑硝

少許細碾為末

右先以手蘸水擦口內并舌上下將藥搽在舌上下

涎出自消

治重舌口中涎出方

出聖惠方

驢乳

一升 猪乳

一升

右相和煎至半升不拘時候服半匙

蒲黃散

出范氏方

治重舌上戴妨礙不能言口中涎出

用新真蒲黃羅細散傳之吐出又傳立消亦治舌腫  
傳舌上不過數上愈須真者可用李莫安撫內子夜  
半忽不能言燭之乃舌下生一舌上戴急取外臺檢  
此方五七傳即愈一方炒礮為末摻之

治重舌

出經驗良方

用竹瀝漬黃蘗無時點舌上

朴硝散

出經驗良方

治重舌喉痺

用朴硝黃丹細散摻重舌上竹筒以半錢許吹入喉中即破吐涎而愈甚者不過兩次

又方

出經驗良方

用五靈脂一兩去砂石為細末用米醋一大盤煎湯旋噙嗽口即安

又方

出經驗良方

用皂角四五挺皮不蛇者去皮炙令乾地上出火毒荊芥穗少許二味為細末米醋調塗腫處即消

治重舌木舌

出范氏方

用川烏尖巴豆為末米醋調刷患處即效木舌須先

服勝金散開關竅

治重舌口中涎出水漿不收

出聖惠方

用鯁箕舌燒為灰細研以溫酒調下一錢

又方

出聖惠方

用伏龍肝研如粉以牛蒡汁調傅之效

又方

出聖惠方

用蛇蛻皮燒灰細研少許傅之效一方治小兒重舌  
燒蛇蛻皮為末睡和塗舌上瘥

治重舌口中涎出方

出聖惠方

右取田中蜂房燒灰細研以好酒和傅喉下立愈

杏仁膏

出聖惠方

治口舌熱乾或舌上生胎語言不真

升麻

杏仁

去皮尖

甘草

炙各一兩

黑豆

五十粒去皮

右為細末入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏  
子凡如雞頭大噙一九嚥津舌上生胎立用薑蘸冷



水擦洗之

薄荷蜜煎

出瘡  
察方

治舌上生白胎乾澀話語不真

白蜜 薄荷自然汁

各等分

右以生薑片先蘸水揩洗再用硃砂雄黃礞砂腦麝  
為末傅之良未效更加玄明粉一方先以生薑蘸水  
揩洗用薄荷自然汁白蜜作煎服之

治大人小兒舌下腫起重舌

出鮑  
氏方

用地鱉虫和薄荷研汁綿包捻舌下腫處

重舌極證

出鮑氏方

用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此  
三次又用擦蘸水取項後燕窠小坑中筋自上幹下  
至堂深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前即病去矣  
半夏酒 治重舌滿口

右用半夏二十枚水煮過再用水泡片時乘熱用好  
酒一升浸密封頭良久取酒乘熱含冷時即吐又含  
熱者以差為度然後再服歸荊湯獨活酒人為邪

氣所干則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒  
若暑若濕腑臟表裏冷熱虛實各有受病之處用藥  
之法必究其原而後可以起病否則前賢所謂獵不  
知兔廣絡原野真一人獲之術亦踈耳是可以人試  
技乎哉一方用羌活得汗則愈

歸荊湯

出指  
南方

治風痙昏迷吐沫抽掣背脊強直產後

中痙通用

當歸

荊芥穗

各等  
分

右為末每服二錢水一盞酒少許煎七分灌下如牙  
關緊用銅匙幹開以雞羽蘸藥入口或用童尿調下  
或以弓筋代當歸亦妙

中風角弓反張

論

中風角弓反張之狀腰背反折不能俛也由風邪客於  
諸陽之經邪正相搏風氣勝則筋脉縮急腰背反折如  
弓之形也

方

天麻丸

一名朱附丸  
出聖惠方

治中風角弓反張口噤不語四肢

拘急并腎臟風毒攻注手足頑麻一切急氣

天麻

白附子

炮裂

附子

炮裂去皮臍

牛膝

去苗

白僵蠶

微炒

羌活

槐膠

羚羊角

屑

防風

去蘆頭各一兩

天南星

炮裂

蟬殼

硃砂

細研各半兩

膩粉

麝香

細研各一分

乾蝎

微炒

半兩

白花蛇

酒浸去皮骨炙研

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗二三百杵丸如雞頭實每服以生薑汁薄荷汁各少許入熱酒二合相

和研下一丸不計時候頻服一方無薄荷汁

犀角散

出聖惠方

治中風角弓反張心神煩亂口禁不語

犀角屑

升麻

去根節

羌活

附子

炮裂去皮臍

杏仁

湯浸

去皮尖雙仁  
麩炒各一兩

防風

去蘆頭

桂心

白朮

人參

去蘆頭

芎藭

白茯苓

細辛

當歸

各三分

石膏

二兩

甘草

炙微赤

剉半兩

右搗羅為散每服四錢以水一盞煎入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時候溫

服

龍腦丸

出聖惠方

治中風身如角弓反張不語悶塞

以半夏醋煎灌漱吐出即瘥

舌腫強

論

夫手少陰為心之經也其氣通於舌足太陰脾之經也其氣通於口太陰之脉起於足大指入連舌本心脾虛為風熱所乘即隨脉至舌熱氣留於心血氣壅滯故舌腫因脾脉脹急則舌本強也○心氣通於舌脾脉挾咽

連舌本散舌下心脾二經受風邪則舌本強不能卷舒  
又或熱氣加之則腫腫則筋脉脹急勢連咽喉礙於呼  
吸法宜刺之洩去惡血然後用藥儒門事親書云南隣  
朱老翁六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦  
腫腫至滿口比元舌大三倍一外科以燔針刺舌兩傍  
下廉泉穴病勢轉亟戴人曰血實者宜決之以針磨令  
鋒極尖輕砭之日砭八九次血出約二三盞如此者三  
次漸少減腫消夫舌者心之候也心主血故血出則愈也



方

白茯苓湯

出經濟  
總錄

治舌腫強

白茯苓

去黑  
皮

牛黃

研各  
三分

犀角屑

一分

甘草

炙

人參

羚羊角屑

白朮

桂

去粗  
皮

熟乾地黄

焙各  
半兩

右粗搗每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

射干湯

出經濟  
總錄

治木舌腫強及天行病丹石發動一

切熱毒

射干 木通

剉

大黃

剉  
炒

馬蘭子

各一  
兩半

漏蘆

去蘆  
頭

升

麻

當歸

切培桂去粗皮

甘草

炙各一兩

右粗搗篩每用五錢匕水一盞半煎至八分去滓分

溫二服日三夜二

牛黃散

出聖惠方

治舌腫強

牛黃

細研

漢防已

各三分

甘草

炙

人參

去蘆頭

羚羊角屑

生乾地黄

牛蒡子

微炒

桂心

各半兩

犀角屑

一分

右為散入牛黃研令勻每服三錢水一鍾煎至六分

去滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治腹中虛熱舌本強直口吻兩邊痛舌

上有瘡噤食不得

柴胡

去苗

川升麻

梔子仁

赤芍藥

木通

各二兩剉

黃芩

大青

杏仁

各一兩半湯浸去皮尖雙仁

石膏

三兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分

每於食後溫服

金沸草散

出危氏方

治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒

浮舌腫

荊芥穗

四兩

旋覆花

前胡

麻黃

去節各三兩

甘草

炙

赤芍藥

半夏

湯浸七次各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎七分去滓漱口吐一半喫一半世鑒用此發散傷風傷寒及加杏仁五味子治咳嗽皆效治舌腫牙疼辛未年有人患舌腫如吹滿塞口中粥藥不入其勢甚危大煎一劑乘熱以紙籠氣衝之即愈

黃連湯

出聖濟總錄

治傷寒舌腫

黃連

去鬚

大黃

生用各一兩

大青

五根升麻

黃藥

各半兩

甘

草

炙三分

右粗搗篩每服五錢匕水二盞黑豆一撮同煎至一盞去滓分溫二服病未退每服更加芒硝末半錢匕和湯下以微利為度

治心脾壅熱生木舌腫脹

一名玄參散出聖惠方

玄參

升麻

大黃

犀角

各七錢

右為末每服三錢水一盞煎五分溫服

牡蠣散

出聖濟  
總錄

治牙疼連牙關急口眼相引木舌腫

強不能轉

牡蠣

煨研

伏龍膽

附子

炮裂去  
皮臍

白礬

煨研各  
半兩

右為散以酒和如泥每用一錢於患處塗貼吐津

正舌散

出危  
氏方

治中風舌本強難轉語言不正

蝎稍

去毒  
一分

茯神木

剉微炒  
一兩

龍腦薄荷

焙乾  
二兩

右為細末每服一二錢溫酒調下或以搽牙頰間亦

得

柴胡散

出聖濟總錄

治舌本強兩邊痛

柴胡

去苗

升麻

各一兩

梔子仁

半兩

右為散每服一錢匕熱水調下日三

蒲黃散

出海上方

治舌忽然腫硬或出血如湧

蒲黃

海螵蛸末

各等分

右為細末每服少許塗舌上瘥

治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人

紫雪

一分竹瀝合

右研紫雪以竹瀝和之時時抹入口中

飛礬散

出海上方

白礬

飛

百草霜

各等分

右為末捻糟茹自熟水調若口噤桃灌之妙

二聖散 治舌根腫硬咽喉不利

紅芍藥 甘草

各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服仍漱嚥之



礬石散

出聖惠方

治舌強不能言語

白礬

研

桂

去粗皮各一兩

右為散每服一錢匕或半錢匕安舌下或上瘥

廣蟲散

出聖惠方

治舌腫滿口言語不得

廣蟲

五枚炙

鹽

半兩

右細研為散以水二盞煎至十餘沸去滓熱含吐以

瘥為度

麝香散

出聖濟總錄

治舌強不語

麝香 皂莢 各半兩

右為散每用半錢摻舌腫上吐津

舌腫強方

出直指方

蛇皮

燒存性

全蠋

各等分

右為末少許摻傳之

治舌暴腫宜摻藥方

出聖惠方

乾薑

半夏

各一分湯浸七遍去滑

右為細散每用少許摻在舌上以瘥為度

百草霜散

一名黑散子  
出危氏方

治舌腫起如猪胞或忽然硬

腫逡巡塞悶殺人

用釜下黑末以醋厚傅舌上下脫去更傅須臾即消  
若先決去血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不識或錯  
治益困殺人甚急且看其舌下自有喋蟲狀如蝼蛄  
或如卧蠶子細看之有頭尾其頭自少燒鐵釘格頭  
上即熟使自消一方釜下墨和鹽等分瀝清水塗腫  
處令遍表裏良久即愈一方用醋調尤妙一方用甘

花水調金下墨鹽成膏傳舌上立愈

治舌腫強滿口方

滿口含糖醋少許時熱通即止

蒲黃膏 治舌腫滿口不能言

用蒲黃調成膏傳舌上下研蓖麻子紙捲燒烟薰之  
隨即縮

治舌腫脹

用好礪砂為末用薄批生薑蘸藥揩腫舌處少時即

退

又方治舌強不語

用蛇膽一枚焙乾碾為末傅舌上有涎吐之

半夏酒 治舌腫滿口氣息不通須臾殺人急以手刺破潰出惡血令其泄氣然後可治亦可用微針決破次用此藥

用半夏十二枚以苦酒一升煮取八合稍稍漱口熱含冷吐半夏勒人咽喉以薑汁解之一方蜜封頭良

久取出含之

蚯蚓方 治舌腫滿塞喉欲死

用蚯蚓一條以少許鹽花化為水以塗咽喉舌上良久漸消

甘草湯 治舌卒腫起滿口塞喉氣不通頃刻殺人以針決舌下兩邊地天脉出血銅筋燒令赤慰瘡數遍亦令血絕

用甘草不拘多少煎湯熱含冷吐

又 治大人小兒重舌腫起舌下

用朴硝研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃平  
又方

用地蜋蟲和薄荷研汁綿包蘸舌下腫處

治舌

用菴耳葉按安舌下令涎出去目黃好睡

治跌倒舌因牙誤枕綻破者

用生薑切作薄片貼之

治舌根腫疼不可忍者

用升麻湯加柴胡枳殼山梔子用水二盞煎至一盞  
去滓服之立效

治舌忽然硬腫逡巡塞悶殺人或血出如湧方一名蒲  
黃散

用烏賊魚骨蒲黃等分為末每用少許塗舌上瘡一  
方用蒲黃摻上瘡

縮舌膏

一名如神散  
出仁存方

治舌腫懸下尺許及傷寒熱毒



攻心舌出數寸

用片腦成片頻於舌上三四次數就縮

又方

出經驗良方

用草麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上二幅熏舌上未退又燒一幅取全此證退如未愈再合用之令愈為度如治牛舌出亦好一法染黃紙捲搥碎草麻子燒烟熏之其舌竟退

巴豆方

出經驗良方

治傷寒後不能轉攝舌出不收者

用巴豆一枚取油霜用紙捲之內入鼻中其舌即收  
治舌卒腫起如吹泡或如猪脬形滿塞喉氣息不通須  
臾不治殺人便以指刮破舌兩邊或破血出尤好亦  
可以鍍刀刮兩邊破之以瘡膏傅之

出聖  
惠方

又方

出肘  
後方

刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出  
不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篦令赤  
熨瘡數過以絕血也

又方

出仁存方

治舌忽然腫破

用釜下墨烟和鹽塗舌上下調酒米醋傅即安

舌強不語

出永類鈴方

用白礬桂心末傅之硬腫悶塞取釜底上煑煤和鹽等分為末塗之一方小豆末醋調塗

如神散

出御藥院方

治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩

椒末

青鹽

各等分另研為末

右每用各抄一錢和勻用水一盞半煎至八分去滓

熱漱冷吐藥盡為度

舌本縮口噤

論

夫心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則生瘡唇揭青色若腑寒則舌本縮口噤唇青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟腑調之

方

獨活鮮噤膏 療小腸腑寒應舌本縮噤口唇青

獨活 芎藭 苦李根皮 天雄 防風 細

各三兩

焙

辛 桂心 蜀椒 甘草 猪肪

右㕮咀綿裹以苦酒一升漬一宿以猪肪微火煎之  
去滓膏或凝以綿裹少許口含於下壓之取瘡日三  
度易之

又生艾葉傳法

無生艾葉取乾者搗之以水淹一升熟搗以帛塗之  
於塞處上封裹之瘡為度

龍石散 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽噤腫塞

疼痛妨悶每用少許摻貼患處嚙津小兒瘡疹毒氣  
攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥摻貼立  
效

硃砂

研飛二兩半

寒水石

生腦子

研二錢半

右為末每服五七次用夜卧摻貼

吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶  
並能治

蒲黃

一兩

盆硝

八兩

青黛

一半

右用薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處用磁罐盛  
慢火熬令乾研細每用一匙或半錢摻於口內良久  
出涎吞之不妨或喉中腫病用筒子入藥半錢用力  
吹之無不立效一方無蒲黃

舌上出血

論

夫心主血在竅為舌若心臟蘊熱則血得熱而妄行或  
溢於心之竅故有舌上出血之證甚者出如湧泉

方

治舌上黑有數孔大如箸出血如湧泉此心臟病

戎鹽

黃芩

一作蔡子

黃蘗

大黃

各五兩

人參

桂心

甘草

各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大米飲服十九日三亦燒鐵

焙

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬

去心焙

當歸

切焙半兩

甘草

生乾地黄

焙一兩



右為末煉蜜丸小彈子大每服一九溫化下一日三

四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

剉

茜根

剉

小薊根

剉

各一兩半

艾葉

去梗

凝水石

碎三兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分生地黃汁一合更煎一二沸去滓溫服

寸金散 治心煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃

三錢

新白麴

三錢半

牛黃

研

生龍腦

各半錢匕

右研極細生藕汁調下一錢匕食後臨卧服日二

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子

洗

白膠香

牡蠣粉

各等分

右為末每用少許摻病處或燒鐵箆熱烙孔上

阿膠散 治舌上血出不止

阿膠

炒燥

蒲黃

黃耆

細剉各一分

右為細散每服一錢匕生地黃汁調下併二服

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾

用糯米半合炒

松黃

栢葉

各炙半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

紫霜丸 治舌上血出竅如針孔

紫金沙

即露蜂房頂上實處是研一兩

蘆薈

研二錢

貝母

去心四錢

右為煉蜜和丸如櫻桃大每服一九化開煎至五分溫服吐血衄血每服一九酒半盞化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連

半兩

黃蘗

三兩

梔子

二十枚

右以酒二升漬前藥一宿去滓煮三沸頓服

聖金散 治舌上忽然血出不止

黃藥子

一兩

青黛

一分

右為細散每服一錢匕食後新汲水調下日二服

鬱金散 治心臟積熱血脉壅盛舌上血出

鬱金

一兩

當歸

切焙半兩

右為散每服一錢匕煎生薑烏梅湯調下

地黃散

出聖惠方

治舌血出如簪孔者

生乾地黃

焙乾

鹿角膠

炒令乾一兩

右為散每服二錢匕食後糯米飲調下

必勝散

出危氏方

治舌衄

真蒲黃

畧炒

螺兒青

各等分

右為末每用少許擦患處少時溫鹽水漱之

治舌硬忽出血不止用木賊煎湯漱之良

清心散 治舌上出血并九孔出血

用刺蘇一握研絞取汁以酒半盞調服如無生汁只搗乾者為末冷水調下三錢匕兼治大衄

黃蘗散 治心臟熱極舌上血出

用黃蘗二兩塗蜜慢火炙焦搗羅為散每服二錢匕

溫糯米飲調下

治舌下上忽出血如簪孔者

出聖惠方

用香薷汁一升日三服一方細嚼即止一方作香薷

治舌上出血如針孔

出聖惠方

用豆二升水三升煮之沸去滓服一升日三一方用  
豆一合水一碗者數沸溫服一盞治下血

治舌上出血如簪孔

出聖惠方

用赤小豆一升杵碎水三升和攪取汁飲一方用苦  
酒和塗舌上

治舌出血不止無故出血仍有小竅此名舌衄

出朱氏集驗方

用槐花晒為末傅舌上或炒槐花地上出火毒傅之

如舌腫以真蒲黃乾摻

治自行被擷穿斷舌心血出不止

以米醋用雞翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖礪砂少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所噙化即安

治舌上出血如簪孔者

出聖惠方

用巴豆一枚燒作屑亂髮如雞子燒末以酒調服之

治舌上出血如泉方


出聖惠方



以燒鐵筋熱烙孔中良

治舌上出血如泉

用五倍膠香牡蠣粉末摻之或燒鐵筋烙其孔



普濟方卷五十九

欽定四庫全書

子部  
普濟方卷六十

詳校官太醫院具稟臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李 燾

騰錄監生臣張 恒

欽定四庫全書

普濟方卷六十

明周王朱橚撰

咽喉門

總論

夫咽者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液五味之氣本也咽門者肝膽之候也其重十兩廣二寸五分胃管長一尺六寸主通五臟六腑津液神氣應十二味若臟熱則咽門閉而氣塞若腑

寒則咽門破而聲嘶母薑酒主之熱則通之寒則補之  
若寒熱調和病不生矣 喉嚨者脾胃之候也重十二  
兩長一尺二寸廣二寸其層圍十二重應十二時主通  
利水穀之道往來神氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏翬膏  
止之若腑寒喉則耿耿如物常欲塞癢痺涎唾熱則開  
之寒則通之不熱不寒依臟調之 咽者胃之系喉者  
肺氣之所通咽以嚥物喉以候氣咽喉嚨三者各有所  
司咽者舌本之根因物之至推而納之以通胃所司者

納而不出喉者候氣之呼吸以通肺所司者有出有入  
嚙者舌下二竅但閉口齒屈舌於上腭則津液滿以通  
心所司者有出無入風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏  
而為咽疼熱氣生於肺胃風毒蘊陰則腫結而為喉痺  
尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令  
尸蟲發動上蝕於喉或疼如蠶之候也穀賊者穀芒強  
澁藏於米而誤食之滯於咽門不能傳化故風熱併聚  
與血氣搏遂令腫刺如喉噎之生穀賊也胃脘實熱燠

灸上焦發為白頭赤根因有咽瘡之證臟腑停寒則氣  
縮如物窒礙其間亦有喉閉之證若懸癰生於上腭雖  
不關於咽喉所以暴腫者亦熱氣使然也咽喉懸癰關  
要所係病不急療皆能殺人凡咽喉病毒氣歸心胃前  
腫滿氣煩促下部洞泄不止者死候也 一十八種喉  
風證論曰一單蛾風其形圓如小筋頭大生於咽喉關  
上或左或右關下難治二雙蛾風有兩枚在關喉兩邊  
亦圓如小筋頭大關下難治三蟬舌風自舌下再生重

舌者是四牙者風牙根上聚成瘡毒者五木舌風其舌  
相似煮熟猪舌不能轉動者六舌黃風自舌上腫痛黃  
色者是七咬牙噤口風近牙窮頭作響口噤不開者八  
魚口風如魚吸水者不治九聚毒塞喉風喉關聚毒涎  
唾稠密發寒熱仍分上下三關破毒下關難治十玄者  
蠱毒風上噬食搶水外腫形如雞卵者十一搶食風一  
名飛絲毒口中或食腥惡發泡者十二臘頰風腮臉絡  
腫者是從牙窮頭碎此毒若成須要半月調理十三纏

喉風自耳邊過頤下赤色者是也亦有寒熱甚者傷人十四松子風口內滿喉赤如猪肝逆張吞則關閉塞飲食不能者是用藥後口內散點松子樣腫則喉響如雷者不治十五崩砂瘡口風自舌上牙齦上下腫赤口內作脹如湯熱牙齦漸爛甚者亦能脫齒十六連珠風自上作毒或初成一箇碎而又作一箇以三五七九箇者是十七蜂子毒或在腮臉痒爛或在喉關舌下作響如黃金蜂者是十八走疰瘰癧風頸項結核五七箇皮膚



赤腫作寒熱者 咽與喉會厭與舌此四者同在一門  
其用各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣  
通於地會厭管乎其上以司開闔掩其咽其食不下掩  
之其喉錯必舌抵上齧則會厭能閉氣喉矣四者交相  
為用闕一則飲食廢而死矣故難經言七衡門而會厭  
之不為吸門及其為病也一言可了一言者何曰火內  
經曰一陰一陽結謂之喉痺王太僕註云一陰者手少  
陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二

火皆主脉並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺甚而不通則死矣夫足少陰循喉嚨挾舌本少陰上挾咽此二者誠是也至於足陽明下人迎循喉嚨足太陰挾咽連舌本手太陽循咽下膈足厥陰循喉嚨之後此數經皆言咽喉獨少陽不言咽喉而內經言一陰一陽結謂之喉痺何也蓋人讀十二經多不讀靈樞經中別一篇具載十一經之正別其文云手少陽之正繞髀入毛際合於厥陰別者入季脇之間循胃裏屬膽散上

之肝貫心以上挾咽出頤頷中散於面繫目系合少陽  
於外者也又手少陰心主之正下淵腋三寸入胃中別屬  
三焦出循喉嚨出耳後合少陽腕骨之下是手少陽三  
焦之氣與手少陰心主之氣相合而行於喉嚨也推十  
二經惟足太陽別下項其餘皆湊於喉嚨然內經何為  
獨言一陰一陽結為喉痺蓋君相二火獨勝則熱結正  
絡故痛且速也故曰一言可了者是也故十二經中言  
噤乾噤痛咽腫頤腫舌本強皆君火為之也惟喉痺急

速相火之所為也。夫君火本猶人火也，相火者猶龍火也。人火焚木，其勢緩；龍火焚木，其勢速。內經之言喉痺，則咽與舌在其間耳。以其病同是火，故不分也。世之醫者，各詳其狀，強立八名，曰單乳鵝、雙乳鵝、單鬪喉、雙鬪喉、子舌、脹木、舌脹、纏喉、風走馬喉、痺熱氣上行、結纏於喉之兩傍、近外腫，以其形似是謂乳鵝一為單、二為雙也。其比乳鵝差小者，名鬪喉；熱結於舌下，復生一小舌，子名曰子舌；脹熱結於舌中，舌為之腫，名曰木舌。脹木者，

強而不柔和也熱結於咽頤腫遶於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉風喉痺暴死者名曰走馬喉痺此八種之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以鍼灸之而大者以辛散之今之醫者皆知其有藥也如薄荷烏頭白礬殭蚕朴硝銅綠之類也至於走馬喉痺何待此乎其生死反掌之間耳其最不誤人者莫如砭針出血血出則病已 昔余以治一婦人木舌脹其舌滿口諸醫不愈以金鉋鍼小而銳者砭之五七度腫減

三日方平計取出血幾至盈斗又治一男子纏喉風表裏皆作腫藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行又以拔毒散傳之陽起石燒赤與伏龍肝各等分為細末日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一貴婦喉痺蓋龍火也隨用涼劑而不可使冷服為龍火宜以人火逐之人火者烹飪之火是也乃使爆於烈日之下於高堂之上令侍婢携火爐坐藥銚子上使藥極熱不至火沸通口時時呷之百餘次龍火自散此以熱行寒不為

熱病扞格也故大抵治喉痺用針出血最為上策但人畏針委曲旁求瞬息喪命凡用針而有針瘡者宜搗生薑一塊調以熱白湯時時呬之則瘡口易合銅人中亦有灸法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痺之火與救火同不容少待經火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能發汗故出血者乃發汗之一端也故願君子毋執小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血若幸遇小疾而獲効不幸遇大病而死矣 咽喉病毒氣歸心

胃前腫滿氣煩促下部洞泄不止此死候也 實熱論

一用敗毒散加黃芩半夏連翹倍用桔梗用生薑薄荷煎痰盛者加石膏同煎即効凡服此藥早晨服則午後攻作午後服則子時攻作天明退用針則無此攻作若服此藥後自利即換作虛熱醫後藥不可用服敗毒散後失音即服加減秘傳降氣湯二用生料消風散加玄參全蝎薄荷白水煎服三用前二藥不退用生料洗心散更加一二味去風毒藥為妙四用前二藥不退用防



風通聖散立效 虛熱論一用雙解散乃升麻葛根湯  
消風散加玄參黃芩薄荷二用秘傳降氣湯加生薑黃  
芩三如痰盛用桑白皮湯磨沉香吞養正丹仍用桔梗  
半夏湯冷木附湯等藥調理又一證上秘下瀉用秘傳  
降氣湯吞碧雪散附子理中湯如無用桑白皮湯亦可  
喉痺者毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而  
痺痛脉沉者為陰浮者為陽若右手關上脉陰陽俱實  
者是喉痺之候也亦令人壯熱惡寒七八日不治則死

喉痺論

夫喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脉沉者為陰浮者為陽若右手之關上脉陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死治法先鍼而後藥可謂急先務矣走馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉

所致 狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風熱毒氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之證俗云此疾由誤嚥狗毛所致治法亦有將飯與狗分食取瘥者禳去之法也

# 方

絳雪散 治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿

木通

剉

桔梗

剉

檳榔

各二兩

枳殼

去瓢

犀角

剉

犀角

各一兩半

柴胡

去苗

升麻

木香

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

劉山梔子

各四兩

桂皮

去粗

人參

各二兩

蘇方木

五兩

訶梨

勒

去核五枚

朴硝

研一斤

丹砂

研一兩

麝香

研一分

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七分以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服一錢或二錢以冷蜜湯調下食後臨卧看老少加減

菖蒲湯

治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如有神鬼

身體強直面目變色

菖蒲

秦艽

去苗土

桂

去粗皮

禹餘糧

煨醋滓

人參

當

歸

切焙

甘草

炙

附子

炮裂去皮臍

黃芩

去黑心

遠志

去心

防風

去

龍骨

各半兩

赤石脂

芎藭

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

防己

各一兩半

右劉如麻豆大每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

空心日再服

乾喉風

出危氏方

朴硝 川烏 當歸 牛膝錢各五 麝香 腦子各半

錢 硼砂 荊芥 薄荷 甘草 蛤粉錢各五 全蝎

七箇  
去毒

右為末用清泔調春用菰菜汁調夏黃麥汁調如不能吞用豆腐切如棊子塊蘸藥入口内含化或新艾汁調下立効

治咽喉痛及喉痺並宜服之

出本草

以通草煎服之磨亦得急即含之

治喉痺腫痛

出本草

取荔枝花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓

含之細細嚥汁瘥

治喉痺

出本草

以天雄炮含之

又方

出本草

以無患子研內喉中立開

開關潤喉蓬萊雪

出危氏方

梅花腦子

生麝香

各一

字

硼砂

三錢

朴硝

五錢

已薄

上別研

研

薄

荷葉

百葉煎

全蝎

去毒

防風

去

粉草

各五錢

已

上別研

研

已

明乳香

沒藥

各三錢

葉盛火

別研

研

或

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

蘆

右為末每服少許以匙挑乾摻咽間及瘡上如在關

下摻舌上並旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水噙

漱或用生薄荷研自然汁調成膏入口噙化亦妙

奪命無憂散

一名玉屑

無憂散

治

纏

喉

風

咽

喉

疼

痛

風

涎

壅

壅

壅

壅

壅

壅

壅

壅

壅

壅

滯口舌生瘡心腹脹脾積癥塊小兒妳癖誤吞骨硝硬



塞不下熱勝喉閉涎滿氣急或悶亂不省人事並療之

寒水石

三兩煨

元參

去蘆

貫衆

去蘆

滑石

研

縮砂仁

去殼

黃

連

去毛

茯苓

炒

甘草

炙

山豆根

荊芥

各半兩生用

硼砂

三錢

右為細末每服一錢乾摻舌上後以新水嚥下不拘

時任是百毒硬物可以除化如喫巴豆杏仁石頭鐵

札麥糖棘針炭瓦子等物及諸藥毒火毒亦可用此

藥每服半錢能潤三焦消五穀除三尸去八邪除百

毒趕瘟疫專醫渴疾其効如神魯直號金臺玉簡方

龍腦散

出聖惠方

治馬喉痺頰咽痛

白龍腦

細研

牛黃

細研

犀角屑

羚羊角屑

馬牙硝

細研

元參

沉香

硃砂

細研

甘草

炙微赤剉已上各一分

川升

麻

半兩

礪砂

一錢細研

右除龍腦牙硝搗篩為散每服三錢匕水一盞竹葉七片煎至六分去滓溫入龍腦牙硝一錢攪令勻細含嚥

利咽湯

治喉咽諸疾

桔梗

枳殼

牛旁子

荊芥

甘草

升麻

元參 大黃 紫蘇 人參 各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎服

生犀丸 治熱衝喉間連頰腫痛吐氣煩滿

犀角

鎊

枳殼

去瓢 麩炒

射干

海藻

洗去 鹹焙

升麻

各一兩

杏

仁

湯浸去皮 尖雙仁研

百合

胡黃連

蒺藜子

炒各三分

白附

子

炮半兩

右為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時

龍腦丸

治喉咽連頰頰腫日數深遠嚥津液熱發渴

疼痛

龍腦

研

升麻

甘草

馬牙硝

研各一分

元明粉

研三分

麝香

研

石膏

碎

大黃

剉黃耆

剉各一分

生地黄

二兩絞取汁

右除地黃汁外搗羅為末以地黃汁和如乾更入鍊過蜜少許為丸如小彈子大用綿裹含化嚥津日四

五次不計時

治經喉風腫痛

黃芩

五錢酒浸

升麻

麻黃

荊芥

薄荷

防風

各一

錢

黍粘子

錢炒四

生甘草

錢半

瓜三稜

錢炒黑

大黃三錢

煨

右咬咀以水一椀煎至七分去滓稍溫服食後隨嚥之

大礪砂散 治喉閉咽腫瘡痛水米難下

礪砂

茯苓

甘草

各半兩

馬牙硝

盆硝

朴硝

薄荷葉

各一兩

殭蚕

二兩

蛇蛻皮

一條

右為細末臘月牛膽汁和成膏穰在腦內高懸陰乾

每用一錢綿裹嚥津

金消丸 治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入

鬱金劉馬牙硝研甘草劉山梔子去皮大黃劉枯樓

根各二兩 元參 白礬 礪砂研各一分

右研為末鍊蜜和丸如鷄頭實大每用一丸綿裹含化嚥津

天門冬丸 治馬喉痺咽喉腫痛唇焦舌乾頤頰連腫

天門冬去心焙元參 惡實炒各一兩百藥煎 紫蘇葉

各半  
兩

甘草

炙剉  
兩半

人參

礪砂

研

龍腦

研各  
一分

右為細末鍊蜜和丸如皂角子大每服一丸食後臨  
卧細嚼溫熟水下

橘皮湯

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣

陳橘皮

湯浸去  
白焙

青竹茹

生地黃

切

黃芩

去黑  
心

白

木

山梔子

各三  
兩

赤茯苓

去黑皮  
二兩

桂

去粗皮  
一兩

芒硝

研湯  
成下

右除芒硝外麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑

半分拍碎棗二枚劈破煎至五分去滓下芒硝末一錢匕攪勻溫服食後日三

仙方奪命丹

出德生堂方

治纏喉風木舌脹雙單乳鵝喉

閉或誤吞鷄魚骨刺竹木簽刺一切咽喉急症

白茯苓

密陀僧

炒黃色

紫河車

各一兩

白殭蠶

直者貫

衆淨縮砂仁

甘草節

各一兩

烏魚骨

去皮各二錢半

麝香

一字

右細末却入麝香研勻同蒸餅包白麵蒸熟四兩和



藥汲新井水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾十年不壞  
每服一九用瓦器研碎新水半盞浸一茶時化開用  
匙挑藥徐滴入喉中勿急用取藥盡為度

木通散

出聖惠方

治喉痺心胃氣悶咽喉妨塞不通

木通

剉赤茯苓

川芒硝

前胡

去蘆頭

桑白皮

各二

兩

羚羊角屑

川升麻

川大黃

各一兩半剉碎微炒

馬蘭

根

一兩

右為麤散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

治喉痺咽喉腫痛上焦風熱痰唾不利

出聖惠方

射干

白藥

各三分

絡石

甘草

生劉

黃藥

各一兩

白礬

灰

半兩

天竺黃

細研

馬牙硝

細研

川升麻

一兩

半

右為細散同研令勻每服以新木綿裹二錢含嚥津

取喉中涎

出危氏方

草烏尖

殭蚕

紫貝根

啾啾

紅椒

白礬

山豆根

皂角

各等分

右為末用霜梅拌藥為丸如指頭大含化一丸取下  
涎然後用鹽湯灌漱吐出不可吞

開喉關

出危氏方

薄荷

山豆根

各五錢

麝香

腦子

各半錢

朱砂

三錢甘

草

青鹽

川烏

各五錢

右為末每服半錢臘月內菰菜汁夏黃麥浸水或葛  
水調如涕唾稠粘用芭蕉水調下或蜜丸指頭大含  
化

金匱要略卷六十一  
搶食風

出危氏方

卷六十一

桔梗

川烏

草烏

防風

甘草

大青根

各五

錢

全蝎

七箇去毒

紫河車

五錢

右為末每服用水一盞連根葱一根紅椒七粒燈心  
七莖同煎三四沸食後熱服不安再用酒一盞入茱  
萸五粒同煎少時熱服之未效用蕉湯調下如落心  
肺間刺痛用宣利藥下如久不治則變為飛絲癆毒  
能傷人命

龍腦破毒散

出御藥院方

治不測急慢喉痺咽喉腫塞不

通

盆硝

研細四兩

白殭蠶

微炒去背為末秤八分

甘草

生用秤八分

青黛

秤八分馬勃

末三錢

蒲黃

半兩

腦子

一錢

麝香

一錢

右研令勻細用麝合子收如有病證每用藥一錢用新汲水小半盞調勻細細呷嚥如有喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作

四五服亦如前法用並不計時候

生銀丸 治口乾咽腫喉頰脹痛

人參半兩丹砂研鉛霜研馬藺根 朴硝研升麻各一

分 硼砂研三錢龍腦研一錢

右為末和勻鍊蜜為丸如皂子大每服一丸含化嚥津

射干湯 治喉痺腫不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干 當歸切焙一兩升麻半兩白芷一兩甘草炙剉犀角鎔

杏仁

湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎七分去滓溫服

日三忌海藻菰菜

禹餘糧湯

聖濟總錄

治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足以

息四逆泄注腹脹喜噫食則欲嘔泄癖澹口下乾四

肢重好怒不欲聞人聲診其脉右手關上陰陽俱虛

者脾胃虛也

禹餘糧

煨醋淬

大麻仁

桑根白皮

各二兩剉碎

乾薑

炮

兩  
黃連去鬚

半兩

白朮

兩一

棗十枚焙取肉

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

食後日三服

如聖勝金鉗

出和濟方

治證服餌與後如聖勝金鉗同品

味少異

朴硝

兩四

芎

兩一

硫黃

細研一兩半

貫衆

兩二

薄荷葉

荆

芥穗

嫩茶

各半兩

右為末裂生葱自然汁攪和為鉗服藥湯使如後方



同簡易如聖勝金鉞法同

治喉痺并時疫毒

桔梗 甘草 升麻 連翹 黍粘子 防風

酒製黃芩

各等分

右咬咀每服五錢水煎細嚥

如聖勝金鉞

出和濟方

治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾

結喉重舌木舌腮頰腫痛屢經用藥不能吞水粥

又方

見前

硫黃

研

川芎

薄荷葉

去枝梗

臘茶

川烏

炮硝石

研

生地黄

各二兩

右為細末以生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安患處便消冒暑伏熱不省人事生薄荷水調研一錠灌下即甦行路常噙一錠即無暑熱之患口舌生瘡不能合口并食熱物如上法服訖用

水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出再以水灌漱嚼藥一  
銚噙口內聚涎裏之如涎滿方吐出如此服三銚便  
能食遇食酒醋鹹酸酢脯炙燂喉中生炮須搗破吐  
血方着薄荷數葉以一銚同嚼井花水吞下沙淋小  
便出血用車前草七葉生薑小塊研爛水調去滓嚼  
藥一銚以水送下分陰陽去風熱化血為涎化涎為  
水常帶隨身備急一銚可活一人小兒只服半銚一  
方去川烏貫衆以嫩茶代臘茶

射干丸 治喉痺腫塞

射干

一兩一分

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

芎藭

犀角屑

各半兩

升麻

一兩一分

甘草

炙半兩

右為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一丸含化嚥津日可三五服瘥忌海藻菘菜

七聖散 治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快

白礬

二錢

馬牙硝

五錢

硝石

一兩

鉛丹

三錢

礞砂

一錢

巴豆

兩枚去殼

蛇蛻

半條

右先研白礬牙硝礪砂三味入罐子內次入硝石消  
次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋火燒成汁便  
用竹片子夾蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪五七度  
取出候冷研為散如小可咽喉腫痛燕津無礙及口  
瘡口乾摻一匙或大段喉痺及馬喉痺或腮頰生瘡  
肉侵咽喉即乾摻半錢安穩仰卧其喉癰腫處自破  
立瘥

療喉痺急疼妨悶不通方

馬藺根

切一升

升麻

三兩

瞿麥

三兩

射干

十兩

犀角

二兩

通

草

二兩

元參

二兩

右切以水八升煮取二升去滓細細含嚥一日令盡

得破膿慎熱麵炙肉蒜

黃芩湯

聖濟總錄

治喉痺胃滿噎塞不通

黃芩

去黑心

升麻

射干

木通

剉各三分

甘草

炙

犀角

各

半兩

右以水麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去

滓下芒硝一錢七細溫呷

如神散 治咽喉一切急患不得開

白礬 白殭蚕

炒 藜蘆

元參

去皮核炒

雄黃

各三錢

乳

香

一匙

右為細末和勻每一匙分兩鼻內搐之口含水及舌

下擦嚏出涎立効

硼砂散

出和濟方

治大人小兒患喉痺閉塞不通腫痛生

瘡語聲不快風壅痰毒鼻衄出血

山藥

六斤生

腦子

研七兩

牙硝

生一十四兩

麝香

研四兩

甘草

硼砂

生各十兩

右為細末每服半錢如茶點服

金鎖匙

出醫學切問方

凡人卒中喉痺口噤咽喉腫痛木舌

重舌者以此藥治之

猪牙皂角

去皮煨

大黃

草烏

鬱金

南星

各四錢

巴豆

五箇去心不去油

右為末生薑自然汁調半錢許以鵝毛拂入喉中已



死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢薑汁調喫吐瀉為驗

南星防風散

出百一選方

治風壅腮頰腫内生結核纏喉

風等疾

當歸

二錢焙乾

天麻

三兩生用

白殭蠶

焙乾

南星

湯浸淨搗細薑汁製焙乾

猪牙皂角

去黑皮焙乾三錢

防風

生用不見鐵器各半兩

右為末每服二錢水一盞薑三片入荊芥少許同煎至七分溫服食後日進三服忌發風毒物如腫不散

者加透明雄黃三錢同前藥一通為末煎服

二砂丸 治喉痺咽塞熱痛

沙參 丹砂研 礪砂 人參 元參 丹參各等用

右為末鍊蜜丸如雞頭實大食後臨卧含化一丸

犀角湯

出聖惠方

治馬喉痺喉中連頰焮腫

犀角

鎔

甘草

炙

升麻

各半兩

射干

桔梗

炒

馬蘭根

剉各三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七

分去滓入馬牙硝末二錢匕攪令勻細細呷服

玉液丸 治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫

百藥煎一兩麝香研朴硝各半錢丹砂二錢龍腦研甘

草末各一錢

右各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧  
桐子大丹砂為衣陰乾含化

犀角散出聖惠方 治喉痺氣隔胃滿咽腫

犀角屑 馬蘭根 射干 枳殼麤炒微黃去瓢 甘草各一

兩生  
用馬牙硝一兩半

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不拘時候稍溫含嚥

碧雪散

出仁存方

治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生

瘡舌根強言語不正腮項痛腫

蒲黃 青黛 礪砂 焰硝 甘草

各等分

右為細末每服手指捻摻喉間嚥津或水下頻頻用之

治咽喉諸疾

朴硝二兩

甘草一兩

蒲黃

薄荷

各半兩

青黛三錢

右為細末每服用一字摻口內

通氣湯

出聖濟總錄

治喉痺氣隔胃滿咽腫生膿

犀角

鎊半兩

射干

桔梗

馬蘭

研各三分

甘草

炙剉半兩

右麤搗篩每服三錢匕以水一盞入竹葉七片煎至

七分去滓下馬牙硝一錢同攪令細細溫呷

又開喉關方

出危氏方

南星 半夏 川烏 草烏 甘草

各五錢

右為末用米醋煎成膏傳毒上

宣利方

出危氏方

巴豆

三七枚  
去殼

雄黃 鬱金 猪牙皂角

大黃

各五錢

右為末飯丸如菉豆大每服七丸五更三點以冷茶清吞下如未利再下四五丸

治咽喉閉疔疽堵塞不通氣水米難下至危者

出御藥院方

牽牛

四兩半生  
半熟用

鼠粘子

一兩防風  
半錢

甘草

生用

枳殼

麩炒去瓢  
各半兩

右為細末每服五錢沸湯點下不拘時候

治喉痺及喉中熱塞

以車轄燒令赤投酒中乘熱飲之

治喉痺

出本草

以紫硃煮汁服

治喉痺

出本草

取橡斗子中仁碎為粉微熬水服一二匕

一匙散

一名如聖散

治喉痺氣塞不通飲食不下者并咽

喉作疼如乳鵝聲

雄黃

一分別研

蝎稍

七枚

白礬

生研

藜蘆

各二錢

猪牙皂角

七錢

右為末每用一匙吹入鼻中即時吐出頑涎為愈神効

一方無蝎稍亦治得時氣纏喉風累用救人萬無一失

治喉痺

出百一選方

大青魚膽

新瓦上焙乾去膜取末

蛇蛻皮

去沙礬碗內燒灰研令極細

白藥

子

新瓦上焙乾各一錢

白殭蚕

直者去絲嘴新瓦上焙乾

白礬

鑊鉞內飛過存性各一兩



右為細末再以乳鉢和研勻每半錢吹入咽喉立愈  
若病輕以多年白鹽梅肉細切入前藥同搗勻丸如  
鷄豆大每服一九含化嚥津如白梅乾硬用湯浸軟  
取肉細切用

通關散

出直指方

白礬

枯

直殭蠶

南星

生

藜蘆

各一分

右為末以小管挑一字吹入鼻中吐痰喉通

如聖丸

出王氏博濟方

治纏喉風及喉痺

大黃

末一分

蝸牛

二七枚

白礬

末

陳白梅皮

馬勃

各一

分

右於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研和丸如棟實大如患者開口不得即以水磨用竹管子吹下入喉中立瘥如輕者以綿裹含化一丸

治馬喉痺頰咽痛

五倍子

半兩

黃蘗

半兩剉

川升麻

三分

甘草

一分炙

微赤剉

右為散每服三錢匕水一小盞煎至四分去滓不計

時候溫服

一捻金散

傳信適  
用方

治喉閉欲死及治喉痛

全蝎

微炒

川鬱金

白殭蚕

去絲  
嘴炒

甘草

炙各  
半兩

地龍

八錢

右為細末入麝香少許每一字吹入喉內舌根不數

次即愈

治咽喉痛

傳信適  
用方

百藥煎

去黑  
皮

礪砂

甘草

白礬

生用

右等分為細末每服一錢食後調飲細細呷之

奪命散 治咽喉

膽礬 牙硝 甘草 青黛 各一錢

右每用少許將蘆管吹喉中立効

龍腦丸 出聖濟方總錄

治纏喉風

龍腦 一分 丹砂 一錢 芒硝 兩半 麝香 半錢

右細研為末用鯉魚膽汁和丸如菜豆大鼻兩孔各塞一丸良久牙關開涎出瘥

消毒寬喉散 出御藥院方

治急慢喉痺咽喉閉塞腫痛或

舌本強硬滿口生瘡

馬牙硝

朴硝

各六兩

青黛

半兩

寒水石

生四兩

右為極細末每服二錢濃煎薄荷湯點勻熱漱咽喉內令吐候嚥不妨不計時候日用三五次

銅青丸

一名千金丸  
出百一選方

不問陰陽閉如急病內外腫塞

輒至不救用之能起死治纏喉風

車前草

嫩者  
半兩

銅青

二錢

大黃

各半兩

牙皂

右為末以白梅肉同研成膏每兩作十五丸用時以

薄綿裹含出涎兩日後則難開矣

牛膽膏

一名佛手散  
出存仁方

治鎖喉風神効

青黛

錢一 蠶

半兩  
去絲

朴硝

一兩  
研

甘草

二錢  
半生

右為末用臘月黃牛膽安藥在內當風掛百日再入  
研麝香少許每服半錢或調服或研碎吹於喉中一  
方不用牛膽作散筒吹喉內一方不用麝香一方各  
等分

殭蠶散

一名三白散  
出仁存方

治喉痺

殭蠶

一條馬勃

莽大者瓦上焙成末

白礬

皂子大生

天南星

一箇炮

右為末大人一錢小兒半錢生薑自然汁調下一方

無馬勃

白梅丸

出仁存方

治喉痺及腫痛

白梅

二十箇取肉

白礬

一錢

甘草

末

生草麻

四十粒去皮

右同研勻和丸如鷄豆大以綿裹之含化

粉香散

出瑞竹堂方

吹乳鵝即開

白礬

三錢

巴豆

二粒輕粉少麝香

少許研

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在上礬枯去巴豆不用細末三味合吹喉

啞瘡咽喉乳鵝方

出瑞竹堂方

雄黃

五錢研

鬱金

五錢

白礬

二錢半生用研

膽礬

半錢

右為極細末以竹筒吹入喉中立能言語

治喉痺乳鵝喉風

硼砂

明礬

膽礬

芒硝

硃砂

各等分同為末

右為細末吹喉中



羅青散

出瑞竹堂方

治咽喉單雙乳蛾及治心肺積熱上

攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痹重舌木舌腫脹

並宜服

蒲黃

五錢

羅青

研

盆硝

各三錢

甘草

二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調下細細嚥之吞不下  
鷄翎蘸藥喉內掃之立効一方砂糖和丸每兩作五  
十丸每服一丸或噙化亦可

烏龍膏

治急喉閉纏喉風

皂角

七挺搥碎水五升按汁去滓

草烏頭

剉天南星

剉大黃

兩

右並入皂角水內煮取二升濾去滓不用再熬成膏入新磁器內候微凝入朴硝末一兩攪勻候冷入白殭蚕末一兩收之如用以半匙頭甘草湯或茶清化下灌入口內立愈如乾以好酒調之不拘時候

又方

鴨背膽礬 銅青 輕粉 胡粉 明礬

右各一字姜茶半錢逐旋和以新汲水調呷嚥之如吐即愈

奪命筋頭散 治急喉閉咽喉腫滿堵塞氣不得通欲

死者

真膽礬

草烏

各四錢

綠礬

六錢

雄黃

二錢

右為細末每服一筋頭點上咽喉內急吐涎末立應次以大黃甘草等分俱為麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓化乳香一粒溫服滌去滓毒恐其再

發一方加白礬二錢

玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風

焰硝

一兩半

礬砂

兩半

腦子

一匙

白殭蚕

一錢

右為末研勻以竹筒吹半錢許入喉中立愈

雄黃散 治纏喉風喉閉先兩日胃膈氣緊取氣短促

忽然咽喉腫痛手足厥氣閉不通頃刻不治

巴豆

七粒三生四熟生者去殼研熟者帶殼研火燒存性

乾桑黃茹片雄黃

一塊皂角子大透明者細研

鬱金

一枚蟬肚者研為末

右再研勻每服半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹管納藥吹入喉中須臾吐利即効一方無乾桑黃

茹

玄參丸

出聖濟總錄

治纏喉風

聖惠方

玄參

白殭蠶

白礬

生用各一分

甘草

生用半分

右為細散用鯉魚膽汁和丸如赤小豆大每服十丸食後溫服生薑湯下日三服

開關散

出王氏博濟方

治走馬纏喉風及喉痺

硝石

六兩

鉛丹

四兩

白礬

砒霜

各半兩

右細研用瓷罐子一箇先入硝石二兩鋪底次下砒霜又入硝石二兩方下白礬更入硝石二兩方下鉛丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方磚一片襯藥罐子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿打罐子取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點咽喉內漸漸嚥津至甚者不過三兩度點

伏龍肝散 治喉痺

伏龍肝

半兩

白礬

煨過

白殭蚕

直者炒

甘草

生各一分

右為散每服一錢匕如茶點服吐出涎立効未吐更一服

治喉痺方

蛇蛻

白梅

白殭蚕

甘草

各等分

右為末綿裹含化嚥津

四聖散

出德生堂

治咽喉口齒喉閉乳鵝

荊芥穗

牛蒡子

炒研細

紫河車

各三錢

大黃

六錢大實者再加用

右吹咀每服五錢水一盞煎八分食後臨卧時先漱後嚥

如聖湯

出旅舍方

治痰去熱利咽喉治咽中有瘡嚥物不

下及咳嗽咯血肺痿痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽  
喉腫痛

桔梗

一兩

甘草

生一兩

牛蒡子

炒一兩

麥門冬

半兩

右為細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙

龍麝丹

治纏喉風

白礬

飛過

雄蛇蛻

於高處凡於屋上樹枝或籬壁  
上者是雄蛇一兩火煨過用

礪



砂<sub>半兩</sub> 麝香<sub>半錢</sub>

研

另研

右研勻用牛蒡子自然汁為餅子如錢大以紅綿包  
噙化如牛蒡子汁稀入糊少許

### 治喉閉方

猪牙皂角

<sub>二錢燒存性</sub>

葛根粉

<sub>一錢</sub>

末茶

<sub>二錢</sub>

乾荷葉

<sub>一錢半</sub>

右為細末吹入喉中即愈

### 治喉痺咽喉腫痛上焦風熱痰唾不利

烏蛇皮

<sub>燒灰</sub>

白梅

<sub>微炒</sub>

甘草

<sub>生剉</sub>

桂心

<sub>半錢分</sub>

右為細末每服以新綿裹二錢含嚥津立通

一捻金散 治咽喉方

銅綠

黃蘗

香白芷

各等分

右為極細末入麝香少許每用一字吹入喉中

如聖丸 治九種咽喉

殭蚕

南星

馬屁勃

各等分

右為細末用鹽梅生薑汁為丸如彈子大噙化

又方

殭蚕 百葉煎 大黃

各等分

右為細末鹽梅為丸如彈子大噙化

通後補助

紫蘇 藿香 甘草

各等分

右剉散每服四錢水煎空心服

治喉痺

大黃 朴硝 白殭蚕

各等分

右為細末水煎量虛實以利為度

吹喉散 治喉痺腫硬水漿不下

白礬

半兩

巴豆

各七枚

右礬白礬剉半夏巴豆在汁中候乾研細吹入喉中

地龍膏 治纏喉風

活地龍

白頸者五條

白梅肉

二箇朴硝二錢

右同研成膏挑入喉中含化

一捻金散 治乳蛾及風熱上攻咽喉腫痛

直殭蚕

去絲嘴三條薑汁浸濕炙黃色

防風

鼠尾者去叉二錢

明礬

三錢研

右為細末用竹筒吹入喉內立愈

治喉痺

猪牙皂角

蜜塗炙香別研

白礬

一分研

雄黃

半兩研

右和勻以濃茶少許調一字安舌上漸嚥下有涎即吐之如牙關緊急點一字如齒藥用之

治纏喉風

青礬 白礬

雄黃

各半兩

右同研細以天南星三兩為末四味同和臘月用牛

膽汁調勻捻成餅子陰乾要用時取少許為末白梅肉為丸如鷄豆大外用綿裹含口中勿令嚥下候汁流咽喉以吐風痰盡為度

治急喉腫閉

藜蘆 瓜蒂 雄黃

右等分為末吹入鼻中蓋通關竅也

半夏桂甘湯 治冷證無陽咽疼喉閉

辣桂 甘草焙 半夏製

右等分剉碎每服三錢水一盞煎半盞冷少呷

山豆根方 治熱閉

山豆根 射干 升麻

各等分

右咬咀用井水二盞同煎至一盞去滓通口時時呷之

又喉閉方

牙硝

五錢

胭脂

半錢

鹽梅屑

一錢

右同研以鷄羽送入

解毒雄黃丸 治纏喉風急喉卒然倒仆失音不語牙關緊急不省人事膈熱涎盛咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱諸證華陀云其證先兩日氣緊驀然咽痛發腫或手足厥霎時氣閉不通多死也

雄黃

飛

鬱金

各一分

巴豆

去皮膜出油十四箇

右為末醋糊丸菉豆大熱茶清下七丸吐出頑涎立甦未吐再服如未至死心頭尚溫灌藥下喉即活吐瀉無妨小兒喉嚨赤腫驚熱痰涎壅塞服二三丸量



大小用一方作散茶清調下如喉閉不開用筒吹入得吐則醒

比金丸 治喉痺

鉛白霜

半兩

青黛

一兩

甘草

半兩

右為末醋糊為丸如鷄豆大含化嚥津痰出立効

胡黃連散 治咽喉中壅塞如核連頰腫痛

胡黃連

一分

升麻

半兩

鉛霜

研一分

右除鉛霜外搗羅為散再同和勻每服半錢匕綿裹

含化嚙津日三五度不計時候

凝水石散 治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉頰俱腫

名走馬喉痺

凝水石

甜硝

各半兩並用無油瓷合盛火煨通赤合於地上出火毒一宿

白

殭蠶

麩炒黃研如粉一兩

右同研勻每取少許摻咽喉中病甚每服二錢匕溫水調下若牙關緊急只於鼻中吸入

奪命散 治急喉風等證

枯白礬

南硼砂

猪牙皂角

皮弦揀去  
各等分

右為細末吹喉中痰出即愈

治喉痺

明礬

膽礬

各二錢半

馬牙朴硝

錢一

右為細末用竹筒吹入喉中手扯住鼻孔一時牙關  
緊急吹入鼻孔中

又方

猪牙皂角

二錢半

硼砂

五倍子

各一錢

右為末用醋蜜調鵝翎點入口中繳出痰

白礬散

出聖惠方

治喉痺氣悶

白礬

礪砂

馬牙硝

各半兩

右於瓷合子盛用鹽泥固濟候乾以炭火煨令通赤取出細研用紙一兩重勻攤置於濕地上以物蓋之一宿出火毒後再細研為散用半錢內於竹管中吹之喉內須臾即通如是咽門腫只以篦子抄藥點於腫處嚥津即瘥

馬牙硝散

出聖惠方

治喉痺氣欲絕

馬牙硝

硝石

礪砂

已上各半兩

右以瓷瓶子內盛用鹽泥固濟候乾以慢火煨成汁良久取出候冷於地坑子內先以甘草水灑後用紙三重裹藥以土蓋之三宿出火毒後取出細研為散每服半錢用篋子抄內咽中嚥津更以竹管吹入喉中瘥

硝石散

出聖惠方

治喉痺熱毒氣盛痛

硝石 白礬

砒霜各半兩

右同細研於瓷合中盛鹽泥固濟候乾炭火中燒令通赤取出向地坑中三日出火毒細研如粉咽喉腫閉處點少許便破

治咽喉

牛膝根

糯米用四十粒碾碎為末

右用水二盞煎服或生用乾用俱妙如治便毒以帶皮生薑米醋調傳之

治喉中毒百發百中及咽喉一切疾

出衛生寶方

皂角

畧炮去土

高良薑

各等分

右為末搗鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後搗之如已結成候少頃要令濃血隨油而出輕者只含水如前法用管子吹入喉中涎出愈神効不可言

治喉痺

出本草

以牛角燒灰為末酒服方寸匕

又方

出本草

取黃蘗根以水研汁含之

保安散 治喉內結核不消

石膽 礪砂

右研細每用竹筒吹之或以筋頭蘸之

去涎散

出危氏方

草烏 鴨嘴青 膽礬

各等分

右為末先用醞醋煮皂角調鵝翎刷傳赤腫處開口  
流出涎即將綿球一指頭大以綿線繫定蘸前藥末



吞嚥至腫毒處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎血却以後合瘡口藥點上停久溫鹽水灌漱後進食亦可合瘡口藥方用白礬黃丹麝香等分為末以筋調點瘡口上

千金療喉舌諸疾方

松子 苦芥子

右搗以苦酒和貼上

金鎖匙

出仁存方

治咽喉腫塞

雄黃末

半錢

巴豆

一粒去油

右作一服生薑自然汁調灌下或吐或下皆愈一方細研每遇急患不可下藥者用有口酒瓶裝入點火一炷燒之候煙起將瓶嘴入一邊鼻中用紙覆瓶口熏之

立聖膏

出百一選方

治纏喉風

巴豆

齊州半夏

各三七粒

右將半夏輕搗每粒分作四片巴豆剥去心膜銀銅石器內米醋三椀文武火熬盡醋為度用清醋微洗

過研為膏子每患纏喉風喉痺或癰疾用一挖耳以生薑自然汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐出惡涎如魚凍相似立愈極有神効

治喉風

皂角

燒灰飛鹽

右為末向喉內吹之一二次必効用淨水漱之

治咽喉紫舌脹

元明粉

白礬

各等分

右為細末吹在口內立効

吹喉散 治喉痺乳蛾喉風

明礬

二膽礬五兩錢

右研細吹患處立効

治喉痺方

青礬

半兩研

杜牛膝草

秋冬用根二寸  
春夏用心梗

右同研看患處以筆蘸少許令吐膿血涎沫即愈

礬硝散

出朱氏  
集驗方

治急喉痺纏喉風兼主重舌咽喉腫

塞軟瘡

白礬

半兩飛過

朴硝

一錢飛過

右細研為末摻入口中其効如神或搐鼻中一方銅筋點腫處再點瘡如穿硬則用針

治急喉腫閉

藜蘆 猪牙皂角

右等分為末吹入喉中

立應丸

一名如聖散  
出十便良方

治纏喉風急喉閉

南星

一箇刮去皮一方炮  
地埋出火毒一夜

白殭蚕

七箇

右挖南星心空作孔子入蚕於內濕紙裹文武火煨  
熟取出等分為末粥飲丸如桐子大如不丸只用綿  
裹藥末吞之亦便如開口不得塗齒上亦妙又為末  
每一匙以生薑汁調下如開喉不得以小竹管劈開  
口灌之涎自出小可只塗於唇上後用大薑一塊略  
炙過含之一方用蜜姜汁調藥將鵝毛蘸藥繳口內  
有涎吐出

鹽礬散

一名玉珍散  
出經驗良方

治喉中乳鵝漸長塞喉者及治

懸喉癰垂長咽中妨悶

白礬

煨為末  
鹽分

右研細用筋頭頻點乳鵝上即焦硬而愈切不可挑  
破後有根時再發

治急喉閉

出經驗良方

馬屁勃

即反  
菰 焰硝各一兩

右為末每用一字許吹入喉內吐涎血出立愈

治走馬喉閉

出朱氏  
集驗方

白殭蚕

半兩  
炒

甘草

一錢  
生

右為末每服一錢生薑汁調下涎出立愈

治纏喉風

出朱氏  
集驗方

白礬 銅綠

右等分為末用一字鼻內搐之

又方

出海上  
名方

生川烏頭尖 膽礬



右等分為末每服一匙酒半鍾調服如口不開即灌之

二聖散

出濟生方

治纏喉風急喉痺

鴨嘴膽礬

二錢半

白殭蚕

去絲嘴半兩

右為細末每服少許以竹管吹入喉中立愈

殭蠶散

一名開關散出仁存方

治喉風急喉痺

白殭蚕

直者去絲嘴焙

明白礬

半飛半生用

右等分為末每服一錢取生薑自然汁濃調嚥下小

兒入新薄荷少許同薑汁研更加生蜜少許同調半  
錢服藥後不可飲湯水解藥力住膈上少時也一方  
白梅和丸皂子大綿裹入喉涎出愈一方蜜丸含化  
神効方

出三因方

治喉閉熱腫語聲不出

荊芥穗

別為末

草麻

生去皮研各等分

右入生蜜少許丸如皂子大以綿裹含化急則嚼化  
一法用朴硝不用荊芥

治喉痺方

牛蒡子

六分馬蘭八分

右擣為散空心煖水調服方寸匕漸加至一匕半日

再服

勝金散

治咽喉卒腫喉痺

戎鹽

一兩青黛半錢

右同研勻每服半錢匕或一字用小筒吹入咽喉嚥

津効

治喉痺方

出聖惠方

白礬

燒令汁枯研

白附子

搗末各等分

右研令勻塗在舌上嚥津有涎即吐之

煙方

出聖惠方

白殭蚕

三七枚直者

乳香

一分

右為末每服一錢匕香爐上燒開口令煙熏入喉中涎出効

療喉痺急疼妨悶不通方

射干

當歸

各三兩

右切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

升麻散

出聖惠方

治喉痺腫熱痛悶

川升麻

一兩

馬蘭子

二兩

右搗細為散每服以蜜水調下一錢

治喉閉立効方

出聖惠方

蝸牛

七枚

白梅子

三枚取肉

右同爛研綿裹如棗核大含嚥津即通

治咽喉牙關緊閉

出聖惠方集成

用巴豆去殼以紙包巴豆肉

用竹管壓出巴豆油在紙上以此紙作撚子點燈吹滅以烟熏入鼻中即時口鼻涎流牙關開矣一方用熱烟刺入口內即出涎或瘀血



普濟方卷六十